

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg

| Skadegørere | Tidspunkt | Løsning | Dosis pr. ha. | BI | Pris | Bemærkninger |
|--|---------------------|---|---|-----------|-------|---|
| Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , hyrdetaske , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , snerlepileurt , tvetand , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Express 50 SX + DFF + Starane 333 HL + Spredede-klæbemiddel | (5 + 0,03 + 0,1 + 0,1) - (9 + 0,03 + 0,1 + 0,1) | 0,80-1,06 | 55-66 | Tokimbladet ukrudt. Meget bred virkning incl. burresnerre og resistent fuglegræs. Express kan erstattes af Trimmer, Nuance m.fl. DFF kan erstattes med Legacy, Diflanil m.fl. Højeste dosis ved meget ukrudt og forventning om åben afgrøde. |
| Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , hyrdetaske , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , snerlepileurt , tvetand , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Express Gold 33 SX + DFF + Starane 333 HL + Spredede-klæbemiddel | (5 + 0,03 + 0,1 + 0,1) - (9 + 0,03 + 0,1 + 0,1) | 0,75-0,98 | 59-72 | Tokimbladet ukrudt. Meget bred virkning incl. burresnerre og resistent fuglegræs. Express kan erstattes af Trimmer, Nuance m.fl. DFF kan erstattes med Legacy, Diflanil m.fl. Højeste dosis ved meget ukrudt og forventning om åben afgrøde. |
| Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , lægejordrøg , pileurt , storkenæb , tvetand , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Zypar + DFF | 0,3 + 0,03 | 0,65 | 76 | Tokimbladet ukrudt incl. jordrøg og storkenæb. Bred virkning, herunder burresnerre og resistent fuglegræs. DFF kan erstattes af Legacy m.fl. |
| Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , lægejordrøg , pileurt , storkenæb , tvetand , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Pixxaro EC + Nicanor SG + DFF | 0,2 + 3 + 0,02 | 0,93 | 101 | Tokimbladet ukrudt incl. jordrøg og storkenæb. Bred virkning, herunder burresnerre og resistent fuglegræs. |
| Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , lægejordrøg , pileurt , storkenæb , tvetand , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Pixxaro EC + Express Gold 33 SX + DFF + Spredede-klæbemiddel | 0,15 + 5 + 0,03 + 0,15 | 0,97 | 97 | Tokimbladet ukrudt incl. jordrøg og storkenæb. Bred virkning, herunder burresnerre og resistent fuglegræs. |
| Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , stedmoder , tvetand , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Mustang forte + DFF | 0,3 + 0,03 | 0,63 | 63 | Tokimbladet ukrudt. Bred virkning, herunder burresnerre og resistent kamille. Ikke roer, bælgplanter eller kartofler året efter. |

| Skadegørere | Tidspunkt | Løsning | Dosis pr. ha. | BI | Pris | Bemærkninger |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|---------|--|
| Agerstedmoder , burresterre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , hyrdetaske , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , snerlepileurt , tvætand , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Saracen M + DFF + Starane 333 HL + Sprede-klæbemiddel | 0,025 + 0,025 + 0,1 + 0,1 | 0,68 | 75 | Tokimbladet ukrudt. Meget bred virkning incl. burresterre og resistent fuglegræs. DFF kan erstattes med Legacy, Diflanil m.fl. |
| Burresterre , fuglegræs , gulurt , hejrenæb , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , sort natskygge , storkenæb | Ukrudt 0-2 løvblade | Express 50 SX + Starane XL + Sprede-klæbemiddel | 5 + 0,2 + 0,15 | 0,59 | 51 | Tokimbladet ukrudt. Bred effekt. Express kan erstattes med Nuance, Trimmer m.fl. Starane XL kan erstattes af Cleave. |
| Burresterre , fuglegræs , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt | Ukrudt 0-2 løvblade | Express 50 SX + Starane XL + Sprede-klæbemiddel | 3 + 0,4 + 0,15 | 0,72 | 78 | Tokimbladet ukrudt. Høj effekt mod burresterre og pileurter. Express kan erstattes med Nuance, Trimmer m.fl. |
| Enårig rapgræs , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , kornvalmue , korsblomstret ukrudt , vindaks | Ukrudt 0-2 løvblade | Hussar Plus OD + DFF + Sprede-klæbemiddel | 0,07 + 0,05 + 0,15 | 1,53 | 113 | Enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt. Hussar Plus OD har effekt mod rajgræs. |
| Bleg pileurt , burresterre , ferskenpileurt , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , vejpileurt | Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere hvis behov | Express 50 SX + Starane 333 HL Starane XL | 6 + 0,15 0,3 - 0,5 | 1,18-1,44 | 106-139 | Pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når næste hold ukrudt er spiret frem. Væsentlig del af effekt mod fersken og bleg pileurt fra ALS-hæmmere. |
| Agerstedmoder , bleg pileurt , burresterre , ferskenpileurt , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , storkenæb , tvætand , vejpileurt | Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere hvis behov | Mustang forte + DFF Starane XL | 0,3 + 0,03 0,3 - 0,5 | 1,02-1,28 | 112-145 | Pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når næste hold ukrudt er spiret frem. Hormonstoffer aminopyralid og 2,4-D i Mustang forte har effekt mod fersken og bleg pileurt, men væsentlig del af effekt er ALS-hæmmer i både 1. og 2. sprøjtning. |
| Agerstedmoder , bleg pileurt , burresterre , ferskenpileurt , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , storkenæb , tvætand , vejpileurt | Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere hvis behov | Pixxaro EC + DFF Mustang forte | 0,125 + 0,05 0,3 | 1,17 | 124 | Pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når næste hold ukrudt er spiret frem. Løsning med andre virkemekanismer end ALS-hæmmere mod pileurter i første sprøjtning. |
| Agerstedmoder , bleg pileurt , burresterre , ferskenpileurt , fuglegræs , hanekro | Ukrudt 0-2 løvblade | Pixxaro EC + DFF | 0,125 + 0,05 | 1,46-1,82 | 158-200 | Resistent pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når |

| Skadegørere | Tidspunkt | Løsning | Dosis pr. ha. | BI | Pris | Bemærkninger |
|--|---------------------------------|--|---|-----------|---------|--|
| hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , storkenæb , tvetand , vejpileurt | 2. sprøjtning 10-14 dage senere | Mustang forte | 0,5 - 0,75 | | | næste hold ukrudt er spiret frem. Dosis af Mustang forte tilpasses effekt af 1. sprøjtning, fra 0,3 l/ha hvis der kun er nyfremspiring. |
| Agerstedmoder , bleg pileurt , burrenerre , ferskenpileurt , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , storkenæb , tvetand , vejpileurt | Ukrudt 0-2 løvblade | Mustang forte | 0,75 | 1,75-1,88 | 196-209 | Resistent pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. I stadiet 21 når væsentlig del af pileurt er spiret frem, typisk langstrakt fremspiring under tørre vejrforhold. |
| Agerstedmoder , burrenerre , ferskenpileurt , fuglegræs , gul okseøjje , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , vejpileurt , ærenpris | Ukrudt 0-2 løvblade | Mustang forte + DFF | (0,3 + 0,025) - (0,5 + 0,025) | 0,60-0,89 | 61-94 | Gul okseøjje. Sprøjt tidligt, gul okseøjje max. 2 løvblade. Ikke roer, bælgplanter eller kartofler året efter. |
| Andet tokimbladet ukrudt , gul okseøjje | Ukrudt 0-2 løvblade | Nicanor SG + Metaxon | (8 + 0,3) - (10 + 0,5) | 0,55-0,75 | 83-131 | Gul okseøjje. Sprøjt i st. 20, gul okseøjje max. 2 løvblade. Højeste dosis, hvis mange okseøjje har 2 løvblade. Nicanor (Ally) kan erstattes med Accurate Max. |
| Agerrævehale , agerstedmoder , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , hyrdetaske , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , tvetand , ærenpris | Afgrødens stadium 12-25 | Primera Super + Sprede-klæbemiddel + DFF + Express 50 SX | (0,5 + 0,15 + 0,03 + 7,5) - (0,6 + 0,15 + 0,03 + 7,5) | 1,20-1,30 | 133-153 | Agerrævehale og tokimbladet ukrudt. Når agerrævehale har 1-2 blade. Primera Super kan blandes med visse ukrudtsmidler. Foxtrot kan anvendes i stedet for Primera Super. |
| Agerrævehale , alm. , hanespore , flyvehavre , grøn skærmaks | Afgrødens stadium 14-25 | Primera Super + Sprede-klæbemiddel | 0,8 + 0,15 | 0,80 | 161 | Flyvehavre, hanespore, grøn skærmaks, agerrævehale. Kan anvendes fra afgrødens stadium 13-14, hvor flyvehavren vil være spiret frem. Hanespore har sen fremspiring. Primera Super kan blandes med visse ukrudtsmidler, tjek etikette eller blandingstabel. Foxtrot kan anvendes i stedet for Primera Super. |